



Terceiro passo: durante 4 dias, lave o rosto antes da aplicação, com água e sabonete neutro. Aplique **Acnase Gel** na área afetada na hora de deitar e deixe durante a noite. Remova com água e sabonete neutro. Após o término da fase de adaptação, utilize o produto normalmente, conforme posologia.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento de uma aplicação, retome a posologia assim que lembrar. Não exceda a quantidade de aplicações recomendada para cada dia. **Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações Adversas: dermatite de contato, eritema, ardor, vermelhidão, descamação e hipersensibilidade. Cerca de 2% das pessoas são alérgicas ao peróxido de benzoíla. Se as reações forem exageradas, pare o tratamento e em alguns dias sua pele voltará ao normal. Compressas frias no local podem produzir alívio da irritação.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

ME281124 - DIM.: 240X150mm - PHC 3164

## 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem, suspenda o uso do produto por alguns dias, e a pele voltará ao normal. Para aliviar os sintomas, realize compressas frias no local. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, se a reação for devida ao uso excessivo, e não à alergenicidade, deve-se reduzir a frequência de uso do produto.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme a RDC nº 576/2021. AFE nº 1.00974-4  
Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Jr.  
CRF-SP nº 5143

## biolab

Notificado e Fabricado por  
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.  
Av Francisco Samuel Lucchesi Filho 1039  
Bragança Paulista SP 12929-600  
CNPJ 49.475.833/0018-46  
Indústria Brasileira  
SAC 0800 724 6522

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 05/01/2018.**



# Acnase GEL

PERÓXIDO DE BENZOÍLA



## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

### APRESENTAÇÃO

Gel dermatológico 50 mg/g de peróxido de benzoíla em bisnaga com 20 g.

### USO EXTERNO

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS**

### COMPOSIÇÃO

Cada g de gel contém:

Peróxido de benzoíla.....50 mg  
Excipientes: propilenoglicol, associação de álcoois graxos e emulsificantes não iônicos, coco glicerídeo, éster cáprico caprílico, isononanoato de cetoestearila, sclerotium gum, goma xantana, metilparabeno, propilparabeno, hidróxido de sódio, simethicone emulsão, água purificada.



## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**Acnase Gel** é indicado para o tratamento da acne.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**Acnase Gel** atua no tratamento tópico da acne. Seu mecanismo de ação se deve ao poder bactericida



e redutor da oleosidade da pele conferido pelo peróxido de benzoíla.

### **Ⓟ 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Acnase Gel** é contraindicado a indivíduos com hipersensibilidade ao peróxido de benzoíla.

**Contraindicado para menores de 12 anos.**

### **❗ 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Evitar exposição ao sol durante o tratamento devido a possibilidade de manchas na pele. O peróxido de benzoíla pode descolorir os cabelos e manchar roupas. Pode ocorrer sensibilização de contato em alguns pacientes, além de vermelhidão e descamação. Em uso prolongado ocasiona dermatite.

#### **Gravidez e amamentação**

Não se sabe se peróxido de benzoíla pode causar dano fetal ao ser administrado em mulheres grávidas ou se pode afetar a capacidade de reprodução. Não existem dados disponíveis do efeito do peróxido de benzoíla no desenvolvimento de recém-nascidos. Peróxido de benzoíla somente deve ser usado por mulheres grávidas se considerado necessário pelo médico.

Informe o seu médico ou farmacêutico se você estiver grávida ou planejando engravidar.

Se você ficar grávida durante o tratamento com **Acnase Gel**, informe o seu médico.

**Categoria de risco de gravidez C.**

**Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez**

**na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.**

#### **Pacientes Idosos**

Não existem recomendações específicas para pacientes idosos.

**Efeitos na habilidade de dirigir ou operar máquinas**

Não foi observada qualquer alteração sobre a habilidade de dirigir ou operar máquinas durante o uso do peróxido de benzoíla.

#### **↻ Interações medicamentosas**

O uso concomitante de outras preparações tópicas para o tratamento da acne, especialmente abrasivos ou descamantes, pode levar a uma irritação cutânea cumulativa e, por isso, deve ser feito com orientação médica.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### **5.ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Mantenha **Acnase Gel** bem fechado e armazenado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

#### **Características do medicamento**

**Acnase Gel** é um gel branco, com odor característico.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

### **Ⓟ 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Aplicar fina camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas vezes ao dia. Recomendável uso de bloqueador solar não alcoólico durante o dia.

#### **Cuidados de administração**

Antes de cada aplicação, lave o local com água e sabonete neutro.

É importante efetuar o teste de adaptação e, só após esse período, seguir posologia indicada. Após os primeiros dias de aplicação, a pele começará a descamar como se tivesse sido queimada pelo sol, podendo ocorrer ardor, ressecamento e vermelhidão que, se moderados, são normais e desejáveis.

#### **Teste de adaptação**

**Primeiro passo:** durante 4 dias, lave o rosto antes da aplicação, com água e sabonete neutro. Aplique **Acnase Gel** na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente 2 horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Havendo boa tolerância, siga o segundo passo.

**Segundo passo:** durante 4 dias, lave o rosto antes da aplicação, com água e sabonete neutro. Aplique **Acnase Gel** na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente 4 horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Não ocorrendo desconforto ou intolerância durante esses 4 dias, siga o terceiro passo.

