



# DISFOR<sup>®</sup>

## CAPS

### SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO TIPO II EM CÁPSULAS

**NOVA FÓRMULA**

ZERO LACTOSE  
ZERO AÇÚCAR

#### INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: 0,275 g (1 cápsula)

	0,275 g	% VD*
colágeno **	40 mg	
colágeno tipo II não desnaturado **	1,6 mg	
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras <i>trans</i> , fibra alimentar e sódio.		
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.		
** 40 mg de colágeno de frango que fornece 10 mg de colágeno total e 1,6 mg de colágeno tipo II não desnaturado.		

**Ingredientes:** óleo de soja, colágeno de frango com colágeno tipo II não desnaturado, emulsificante: lecitina de soja, glaceante: cera de abelha (branca), cápsula (água purificada, geleificante: gelatina, umectante: glicerol e corante: óxido de ferro amarelo).

**ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN**

#### O que é DISFOR<sup>®</sup> CAPS?

**DISFOR<sup>®</sup> CAPS** é um suplemento alimentar de colágeno tipo II não hidrolisado.

O colágeno tipo II auxilia na manutenção da cartilagem articular.

A cartilagem articular é composta por células denominadas condrócitos e pela matriz extracelular, composta principalmente por colágeno tipo II e proteoglicanos. Essas moléculas conferem à cartilagem propriedades como rigidez e elasticidade. O equilíbrio entre a produção e a renovação desses componentes garante a manutenção das funções da cartilagem<sup>1</sup>.

Durante a vida e em algumas doenças, como a osteoartrite, o colágeno tipo II e outras estruturas articulares sofrem degeneração, resultando em perda funcional da cartilagem<sup>1</sup>.

A suplementação de colágeno auxilia no tratamento de algumas desordens articulares, como a osteoartrite e artrite reumatoide, que envolvem inflamação e degradação da cartilagem articular<sup>1-4</sup>. O uso continuado de colágeno tipo II não hidrolisado leva a redução da dor e melhora da mobilidade articular em indivíduos com doenças articulares, bem como em indivíduos saudáveis, com dor relacionada à prática de atividade física.

#### Referências bibliográficas:

- 1 - Rezende UM. Cartilagem Articular e Osteoartrite. Acta Ortop Bras 8(2) - abr/jun, 2000.
- 2 - Crowley DC, et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Nt J Med Sci 2009; 6(6):312-321.
- 3 - Lugo J, et al. Undenatured type II collagen (UC-II<sup>®</sup>) for joint support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013; 10: 48.
- 4 - Bioiberica. B-2COOL<sup>®</sup> Low dose, great effects.

Disponível em: [https://www.bioiberica.com/files/pagina/pdf/20180308125339\\_1.pdf](https://www.bioiberica.com/files/pagina/pdf/20180308125339_1.pdf) Acesso em: 12/06/2018.

#### Recomendação de uso:

Uso adulto. Ingerir por via oral, 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do médico e/ou do nutricionista.

#### Como DISFOR<sup>®</sup> CAPS deve ser armazenado?

Mantenha em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz, calor e umidade.

**ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.**

**NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.**

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

**ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.**

#### Fabricado por:

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.  
Rua Solange Aparecida Montan 49 Jandira SP  
06610-015 CNPJ 49.475.833/0014-12  
Indústria Brasileira

SAC 0800 724 6522

biolab

ME292399