

biolab

Contractubex® Gel

GEL PARA CICATRIZES

Composição:

Aqua, Peg-200, Allium cepa bulb extract, Xanthan Gum, Allantoin, Parfum, Citronellol, Methylparaben, Sorbic Acid.

Composição (português):

Água, Macrogol, Extrato do bulbo da cebola, Goma xantana, Alantoína, Perfume, Citronelol, Metilparabeno e Ácido sórbico.

O que é Contractubex® Gel?

Contractubex® Gel é um Gel à base de Cepalin® e alantoína, que auxilia na hidratação da pele, proporcionando melhora da aparência geral, cor e textura das cicatrizes. Sua fórmula possui componentes que apresentam ações complementares: o Cepalin® age sobre a formação de tecido cicatricial e a alantoína sobre a hidratação da pele. Assim, **Contractubex® Gel** auxilia na melhora da aparência e na prevenção da formação de cicatriz.

O que é cicatriz?

As cicatrizes aparecem quando a pele se refaz de machucados causados por acidentes, doenças ou cirurgias. Elas fazem parte do processo de cura e a sua aparência depende do tipo de lesão, tipo de pele, local do corpo e também dos cuidados que foram tomados logo após a lesão. Os cuidados preventivos são essenciais para a formação de uma cicatriz uniforme e com aparência adequada, o que envolve:

- Cuidados com a higiene do local
- Evitar exposição ao sol na pele recém-cicatrizada
- Uso de produtos que possuam propriedades hidratantes e favoreçam a cicatrização.

Por que usar Contractubex® Gel?

Contractubex® Gel suaviza a textura da pele e restaura a densidade da superfície cutânea. Melhora a hidratação e aparência das cicatrizes, além de controlar a produção excessiva de tecido cicatricial. A composição de **Contractubex® Gel** auxilia na prevenção de cicatrizes inestéticas.

Como utilizar Contractubex® Gel?

Aplicar **Contractubex® Gel** para cicatrizes duas vezes ao dia com massagem moderada sobre a pele até completa absorção do gel.

Quando usar Contractubex® Gel?

Contractubex® Gel deve ser utilizado para melhora da aparência da cicatriz, apenas quando o ferimento estiver completamente fechado ou após remoção dos pontos.

Contractubex® Gel pode ser utilizado também na prevenção da formação de cicatrizes de pequenos traumas, cirurgias e queimaduras.

Por quanto tempo usar Contractubex® Gel?

Recomenda-se utilizar um período mínimo de 1 mês para que os resultados comecem a ser notados, e uso por pelo menos 3 meses para obter-se melhores resultados.

Orientações ao consumidor:

Produto de uso externo.

Não deve ser usado em cicatrizes abertas ou úlceras.

Como devo armazenar?

Mantenha o produto em temperatura ambiente.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

EVITE CONTATO COM OS OLHOS.

EM CASO DE IRRITAÇÃO, SUSPENDA O USO E PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

biolab

AFE nº 2.07811.3
Processo nº: 25351.554622/2021-37
Resp. Técnico: Dr. Dante Alario Jr.
CRF-SP nº 5143

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Av. Paulo Ayres, 280 Taboão da Serra – SP
CEP 06767-220
CNPJ 49.475.833/0001-06
Indústria Brasileira

SAC: 0800 724 6522
www.biolabfarma.com.br

*Fabricado e distribuído sob licença de Merz
Therapeutics GmbH, Frankfurt/Alemanha*

ME48671 - DIM.: 240 X 150 mm