

colágeno não hidrolisado tipo II

**SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO TIPO II
EM CÁPSULA GELATINOSA MOLE**

NOVA FÓRMULA

ZERO LACTOSE
ZERO AÇÚCAR
NÃO CONTÉM GLÚTEN

**AUXILIA NA MANUTENÇÃO
DA FUNÇÃO ARTICULAR**

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 0,275 g | % VD * |
|-------------------------------------|--|---------------|
| colágeno ** | 40 mg | |
| colágeno tipo II não desnaturado ** | 1,6 mg | |
| Porção: 0,275 g (1 cápsula) | Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras <i>trans</i> , fibra alimentar e sódio. | |
| | *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |
| | ** 40 mg de colágeno de frango que fornece 10 mg de colágeno total e 1,6 mg de colágeno tipo II não desnaturado. | |

Ingredientes: óleo de soja, colágeno de frango com colágeno tipo II não desnaturado, emulsificante: lecitina de soja, glaceante: cera de abelha (branca), cápsula (água purificada, geleificante: gelatina, umectante: glicerol e corante: óxido de ferro amarelo).

**ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

O que é colágeno não hidrolisado tipo II?

O colágeno não hidrolisado tipo II é um suplemento alimentar que auxilia na manutenção da cartilagem articular.

A cartilagem articular é composta por células denominadas condrócitos e pela matriz extracelular, composta principalmente por colágeno tipo II e proteoglicanos. Essas moléculas conferem as propriedades da cartilagem como rigidez e elasticidade. O equilíbrio entre a produção e a renovação desses componentes garante a manutenção das funções da cartilagem¹.

Durante a vida e em algumas doenças, como a osteoartrite, o colágeno tipo II e outras estruturas articulares sofrem degeneração, resultando em perda funcional da cartilagem¹.

A suplementação de colágeno auxilia no tratamento de algumas desordens articulares, como a osteoartrite e artrite reumatoide, que envolvem inflamação e degradação da cartilagem articular¹⁻⁴. O uso continuado de colágeno tipo II não hidrolisado leva a redução da dor e melhora da mobilidade articular em indivíduos com doenças articulares, bem como em indivíduos saudáveis, com dor relacionada à prática de atividade física.

Referências bibliográficas:

- 1 - Rezende UM. Cartilagem Articular e Osteoartrose. Acta Ortop Bras 8(2) – abr/jun, 2000.
- 2 - Crowley DC, et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Nt J Med Sci 2009; 6(6):312-321.
- 3 - Lugo J, et.al. Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013; 10: 48.
- 4 - Bioiberica. B-2COOL® Low dose, great effects.

Disponível em: https://www.bioiberica.com/files/pagina/pdf/20180308125339_1.pdf
Acesso em: 12/06/2018.

Recomendação de uso:

Uso adulto. Ingerir por via oral, 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do médico e/ou do nutricionista.

Como COLÁGENO TIPO II deve ser armazenado?

Mantenha em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz, calor e umidade.

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.

NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.