

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião- dentista.

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso de esquecimento de dose, passar a pomada ao lembrar, não sobrepondo a dose. Não ultrapassar 2 aplicações diárias.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião- dentista.

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações de hipersensibilidade.

Informe ao seu médico, cirurgião- dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidos casos de superdosagem com o uso de Ad-Muc®.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro mé-

dico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Registro MS 1.0974.0172

Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Jr.

CRF-SP nº 5143

**biolab**

Fabricado por

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

Av Francisco Samuel Lucchesi Filho 1039

Bragança Paulista SP 12929-600

CNPJ 49.475.833/0018-46

Indústria Brasileira

Registrado por

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

Av Paulo Ayres 280 Taboão da Serra SP

06767-220 CNPJ 49.475.833/0001-06

SAC 0800 724 6522

Indústria Brasileira

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.



Esta bula foi aprovada pela ANVISA em  
06/10/2021.

**Ad.muc**<sup>®</sup>

Extrato fluido de *Chamomilla recutita*  
MEDICAMENTO FITOTERÁPICO



## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

### • APRESENTAÇÕES

Pomada de 100 mg em embalagem com bisnaga de 10 g.

### • USO EXTERNO.

• USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS.

### • COMPOSIÇÃO

**Pomada**

**Ad-Muc<sup>®</sup> 100 mg:**

Cada 1 g da pomada contém:

Extrato fluido de *Chamomilla recutita*..... 100 mg (equivalente a 0,30 mg de apigenina - 7 glucosídeo)

Excipientes: Tintura de mirra, glicerol, álcoois de lanolina, álcool cetosteárilico, petrolato branco, petrolato líquido, goma xantana, metilparabeno, óleo de menta, sacarina sódica e água purificada.




## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Ad-Muc<sup>®</sup> é indicado para o tratamento das gengivas e da mucosa oral, nos casos de gengivite (inflamação da gengiva), estomatite (inflamação





da mucosa oral) e outras inflamações da cavidade bucal. Também é indicado nas irritações bucais originadas de dentaduras mal ajustadas.

## 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**Ad-Muc®** contém em sua formulação extrato fluído de Camomila (*Chamomilla recutita*), que possui reconhecidas propriedades anti-inflamatórias.

A Camomila possui diversas substâncias anti-inflamatórias que auxiliam no processo de cicatrização de pequenas feridas na mucosa bucal: o camazuleno exerce efeito anti-inflamatório, enquanto o  $\alpha$ -bisabolol, outro componente da camomila, também apresenta ação anti-inflamatória e promove a regeneração tecidual (cicatrização). Os polissacarídeos presentes na camomila possuem atividade imunoestimulante, ou seja, estimulam os mecanismos de defesa do corpo. O efeito antibacteriano foi demonstrado com o uso do óleo essencial da camomila.

## 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Ad-Muc®** não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, aos parabenos (metilparabeno, presente na formulação), e às plantas da família Compositae.

**Este medicamento é contra-indicado para uso por lactantes e crianças menores de 3 anos de idade.**

**Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.**

## 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Gravidez** – até o momento, não foram relatados efeitos adversos com o uso de **Ad-Muc®** em mulheres grávidas. Entretanto, recomenda-se evitar o uso excessivo durante o período de gestação. **Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez, desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.**

**Lactação** – **Ad-Muc®** não deve ser utilizado por mães que estejam amamentando.

**Pediatria** – **Ad-Muc®** não deve ser usado por crianças menores de 3 anos de idade.

**Geriatrics (idosos)** – não há restrições específicas para o uso de **Ad-Muc®** em pacientes idosos.

Não são conhecidas interações medicamentosas com o uso de **Ad-Muc®**.

Não são conhecidas interferências em exames laboratoriais com o uso de **Ad-Muc®**.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha **Ad-Muc®** em temperatura ambiente (15 a 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do produto: Pomada marrom-amarelada a marrom, com textura cremosa e odor de menta e camomila.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Uso tópico. Este medicamento deve ser administrado somente pela via recomendada para evitar riscos desnecessários.

Lavar e secar as mãos antes do manuseio do produto. Aplicar **Ad-Muc®** duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, após escovar os dentes ou após as refeições, até o desaparecimento dos sintomas ou conforme orientação médica.

Aplicar **Ad-Muc®** na gengiva com a ponta do dedo seco (utilizar o dedo indicador para as regiões externas da gengiva e o dedo polegar para as regiões internas) e massagear as mucosas. A gengiva deve ser massageada em movimentos circulares, dirigidos para a coroa do dente. Em caso de salivagem aumentada, deve-se secar a gengiva antes da massagem.

